
Hohes Rückfallrisiko nach Absetzen von Risperidon bei Alzheimer

r -- Devanand DP, Mintzer J, Schultz et al. Relapse risk after discontinuation of risperidone in Alzheimer's disease. N Engl J Med 2012 (18. Oktober); 367: 1497-507

[\[LINK\]](#)

Alzheimer-Demenzkrankte mit psychotischen oder agitierten und aggressiven Symptomen werden oft mit Risperidon (Risperdal® u.a.) behandelt. In dieser randomisierten Studie wurden nach einer offenen Phase Demente, die positiv auf die Behandlung reagiert hatten, nach dem Zufall in drei Gruppen eingeteilt und erhielten entweder weiter 32 Wochen Risperidon, 16 Wochen Risperidon und 16 Wochen Placebo oder 32 Wochen Placebo. Sowohl nach 16 als auch nach 32 Wochen war die Rückfallrate für die mit Placebo Behandelten mit 60% fast doppelt so gross wie unter Risperdal mit 33%. Bezüglich schwerer Nebenwirkungen bestanden keine Unterschiede. Obwohl vor allem eine länger dauernde Behandlung von Dementen mit Neuroleptika oft kritisiert wird, mahnt diese Studie zur Vorsicht bei einem Absetzversuch.

Telegramm von Niklaus Löffel