

Schmerzen noch viele Jahre nach einer Brustkrebsoperation häufig

k -- Mejdahl MK, Andersen KG, Gärtner R et al. Persistent pain and sensory disturbances after treatment for breast cancer: six year nationwide follow-up study. BMJ 2013 (11. April); 346: f1865

[\[LINK\]](#)

Von allen in den Jahren 2005 und 2006 in Dänemark wegen eines Mammakarzinoms operierten Frauen waren 2'828 für diese Studie geeignet und wurden 2008 und 2012 mit einem spezifischen Fragebogen nach Schmerzen oder Sensibilitätsstörungen im Bereich der operierten Brust, der homolateralen Axilla oder des homolateralen Arms befragt (Rücklauf der Fragebogen 89%). Im 2008 berichteten 45% und im 2012 noch immer 37% (903 Frauen) über persistierende Schmerzen. Besonders hervorzuheben ist, dass 15% aller Frauen, die bei der ersten Befragung keine Schmerzen angegeben hatten, bei der zweiten Befragung im 2012 über Schmerzen berichteten. Nach einer axillären Lymphknotenausräumung waren postoperative Schmerzen signifikant häufiger als nach einer Biopsie des Sentinellymphknotens. Frauen unter 49 Jahren litten signifikant häufiger unter Schmerzen als ältere.

Telegramm von Niklaus Löffel